

MOJ BIO VRT eko metrob

naravno brez kompromisov

Pepelovke

na sadnih vrstah in vrtninah

Preprečevanje: izbor manj občutljivih sort. Škropljenje s

Plantonic zvišuje odpornost rastlin na pojav bolezni.

Zatiranje: škropljenje s sredstvom **Vitisan** čim hitreje po pojavu prvih peg in pred razširitvijo bolezni. Ponovitve škropljenj po navodilih.



Koloradski hrošč

na krompirju in jajčevcih

Zatiranje: škropljenje rastlin z

Neem Azal T/S po obeh straneh listov ob pojavu prvih ličink, oz. poškodb rastlin. Ponovitve škropljenj po navodilih.



Listne uši

na vrtninah

Preprečevanje: z uporabo Plantonic spodbujajte lovce na uši: pikapolonice in tančičarice.

Izogibajte se gnojenju z gnojili, ki imajo veliko dušika. Če je uši manj, rastline stuširajte z vodo.

Zatiranje: rastline z **Neem Azal T/S** škropite takoj, ko uši opazite. Vrtnine so užitne nekaj dni po uporabi.



MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

Češnjeva muha

na sadnih in okrasnih vrstah češenj

Preprečevanje: odpadlo sadje poberite in ga uničite, dokler so črvi še v njem. Tako preprečite, da prezimijo.

Vabe Compo namestite na drevesa, da ulovite muhe, preden izležejo jajčeca. Uporabljajte od aprila do junija.



Polži na vrtu in v travi

Preprečevanje: uničevanje gnezd z jajci jeseni ter pobiranje in odstranjevanje polžev z vrta od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Zastiranje gredic s **FruX zastirko**. Njena suha in groba površina otežuje dostop polžem.

Zatiranje: zanesljivo delujejo **Compo BIO sredstvo proti polžem**. S posipanjem pričnite, čim se tla odtajajo. Granulat enakomerno porazdelite med kulturne rastline.



Kodravost breskev, nektarin in marelic

AlgoVital Plus spodbuja spomladansko rast in krajša kritično obdobje okužb.

Dezinfekcija »odprtih mest« na poganjkih z bakrom (npr. Cuprovin) v času jesenskega odpadanja listov ter od zgodnje spomladi naprej.



MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT

FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

Vitisan, NeemAzal, Agree WG, Compo BIO sredstvo proti polžem - Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe.

Nasvet

Pred sajenjem se prepričajte, da so sadike zdrave in močne ter da na njih ni znakov bolezni ali škodljivcev. Preverite tudi kakovost substrata v lončku rastline, saj se lahko škodljivci in njihove ličinke skrivajo tudi v njem. Ob sajenju rastlinam zagotovite kakovosten namenski substrat in jih tekom rasti redno gnojite.

Strune

na sejancih in sadikah
vrtnih, gomoljih in korenih


Preprečevanje: z gred redno odstranjujte plevel, za gnojenje pa ne uporabljajte zapleveljenega hlevskega gnoja in komposta. Ukrepe podkrepite z uporabo **Rasti SoilTonic G**. Sredstvo za izboljšavo tal, obremenjenih s strunami, v času setve ali sajenja rastlin plitko zagrebite v tla. Škropljenje krompirja in drugih gomoljnic s **Plantonic**. **Zatiranje:** bioloških metod zatiranja ni.



Gosenice škodljivih metuljev

na vrtninah

Preprečevanje: pokrivanje vrtnin z mrežami ali koprenami preprečuje metuljem odlaganje jajčec. **Zatiranje:** ob pojavu prvih gosenic rastline škropite z **Agree WG** in ponavljanje po navodilih.



Resarji, molji in muhe

na vrtninah

Preprečevanje: sočasna vzgoja vrtnin, ki druga drugi odganjajo muhe (npr. kombinacija korenja in čebule). Podobno učinkuje redna uporaba **Plantonic**. Ulov škodljivcev na barvne plošče **Rebell**, nameščene nad rastlinami. **Zatiranje:** škropljenje z **Nemaplus** koristnimi ogorčicami, naravnimi sovražniki škodljivcev.



MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP


MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT

Rje

na vrtninah

Preprečevanje: odstranjevanje okuženih ostankov in škropljenje s **Plantonic**.



Plesni in pegavosti

na krompirju in paradižniku

Preprečevanje: sajenje zgodnjega krompirja. Sajenje paradižnika v zaščitenem in zračnem prostoru. Zalivanje tal brez močnega curka in močenja listov. Škropljenje s **Plantonic** in **Mycosin** za krepitev rastlin, ki so občutljive na plesni in pegavosti.



MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

Brazdasti trsni rilčkar

na rododendronih in drugih okrasnih vrstah ter jagodičju

Preprečevanje: pozornost pri nakupu sadik; škodljivca največkrat na vrt prinesemo s sadiko (ličinke v substratu v loncih). **Zatiranje:** s koristnimi ogorčicami **Nematop Cool** za spomladansko zatiranje ličink, **Nematop Rilčkar Stop** poletno vabo za hrošče in **Nematop** za jesensko zatiranje ličink.



Škržati

na vrtnicah in rododendronih

Preprečevanje: vrtnice in rododendrone pregledajte že konec maja, da preprečite hitro zvečanje številčnosti škodljivcev, ki izsesavajo liste rastlin. **Zatiranje:** kakor hitro se pojavijo prvi škodljivci, rastline poškopite z **Neem Azal T/S**. Rastline tretirajte zjutraj, ko so škržati še počasni zaradi hladnega zraka.



MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

Navadni bramor v vrtu

Zatiranje: enostavna rešitev težav z bramorjem je uporaba **Nemastar** koristnih ogorčic, ki so naravni sovražnik škodljivca.



MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP

Več informacij o proizvodih najdete na www.metrob.si ali pa nas kontaktirajte na info@metrob.si, tel. 03 7806 330.



Višisan, NeemAzal, Agree WG, Compo BIO sredstvo proti polžem – Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu. Fitofarmacevtsko sredstvo z omejenimi pogoji trženja in uporabe.